

PATIENTVEJLEDNING

GASTROSKOPI

_____ DAG DEN _____ KL. _____

Speciallæge i intern medicin:
Gastroenterologi og hepatologi
Peter Nissen Bjerring
Dr. Tværgade 30, 4
1302 København K
Tlf. 33 11 31 79

www.mavetarmklinikken.dk

Revideret 21.2.2026

Hvad er en gastroskopi?

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Ved undersøgelsen kan man tage vævsprøver af slimhinden.

Forberedelse

Du skal møde FASTENDE, det vil sige, at du ikke må spise eller drikke 6 timer før undersøgelsen.

Vigtig medicin kan indtages med lidt vand om morgenen.

Du må ikke tage mavesyrepræparater som fx omeprazol, pantoprazol eller lanzoprazol 5 dage inden gastroskopian.

Det er tilladt at anvende antacida (Balacid, Link og lignende).

Undersøgelsen

Inden undersøgelsen får du lidt lokalbedøvende creme i begge næsebor. Dette virker lokalbedøvende og fungerer samtidig som glidecreme. Under undersøgelsen ligger du på venstre side.

Gastroskopet (ultratyndt 4,85 mm) føres langsomt frem via det ene næsebor og videre ned i spiserøret. Du kan hele tiden trække vejret uden problemer.

Under selve undersøgelsen er det vigtigt, at du slapper godt af og trækker vejret roligt.

Du kan fornemme en trykken af luft i maven, som kan give en let bøvsetrang, men det meste af luften suges op igen, inden undersøgelsen afsluttes.

Det gør ikke ondt at få taget vævsprøver.

Undersøgelsen tager ca. 5 minutter.

En sjælden gang kan undersøgelsen ikke gennemføres gennem næsen grundet manglende plads – den vil da blive udført gennem munden.

Du kan også efter eget ønske vælge at få undersøgelsen foretaget gennem munden.

Bagefter

Der er ingen specielle forholdsregler efter undersøgelsen, du må spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsens ophør.

Du kan forlade klinikken umiddelbart efter undersøgelsen.

Såfremt du har fået beroligende medicin – hvilket rutinemæssigt ikke er nødvendigt – må du ikke køre bil, cykle eller betjene maskiner resten af dagen.

Komplikationer

Der kan i få tilfælde opstå en let næseblødning efter undersøgelsen.

Alvorlige komplikationer til undersøgelsen forekommer yderst sjældent. Hvis der er taget vævsprøver, kan der i uhyre sjældne tilfælde ses blødning og hul på spiserøret, mavesækken eller tolvfingertarmen afhængig af, hvor prøverne er taget.

Skulle der efter undersøgelsen opstå blødning, feber og tiltagende smerte, bedes du kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue.

Svar på undersøgelsen

Inden du går hjem, får du svar på undersøgelsen og den videre plan aftales. Svar på vævsprøver har vi først efter 2 uger.